

Keičiamas COVID-19 infekcijos valdymas

Nuo 2022 m. gegužės 1 d. šalyje atšaukus ekstremaliają situaciją dėl COVID-19 ligos, keičiama COVID-19 ligos valdymo strategija. Visi OV sprendimai dėl COVID-19 bus pripažinti netekę galios. Švietimo įstaigose liks galioti tik higienos reikalavimai, kokie buvo ir iki pandemijos. Pavyzdžiui, dėl patalpų vėdinimo ir pan.

Ugdymo įstaigose atsisakoma periodinio testavimo savikontrolės testais, paviršių tyrimų, tačiau visos ugdymo įstaigos bus aprūpintos savikontrolės testais, kuriuos galės panaudoti (atlikti mokinių/darbuotojų testavimus) individualiai, pagal poreikį.

Testavimas dėl COVID-19 ir vakcinacija bus vykdomi šalies gydymo įstaigose, nebelieka mobiliųjų punktų, tyrimai bus atliekami tik simptomus jaučiantiems asmenims šeimos gydytojo sprendimu. Asmenys, jaučiantys COVID-19 ligos simptomus, turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją. Šeimos gydytojo sprendimu COVID-19 ligai nustatyti bus naudojami greitieji antigeno testai. Patys pacientai registruotis tyrimui negalės, registraciją vykdys gydymo įstaigos. Kadangi mobilieji punktai šalies savivaldybėse bus naikinami, pacientų registracijos į mobiliuosius punktus nuo gegužės 1 d. bus atšauktos.

Nebebus privaloma izoliacija asmenis, kuriems patvirtina COVID-19 liga. Žmogus bus laikomas pasveikusiu gydytojo sprendimu, jei per 24 val. nebekarščiuos ir susilpnės kiti simptomai. Simptomus jaučiantiems žmonėms nerekomenduojama vykti į darbą, ugdymo įstaigą, kitas viešas žmonių susibūrimo vietas.

Izoliuotis neturės nei keliautojai, nei sąlytį turėję asmenys.

Visose viešose uždaroje vietose, taip pat ir viešajame transporte nebelieka privalomo reikalavimo dėvėti nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių. Rekomenduojama kaukes dėvėti viešose uždaroje vietose, kurios yra prastai vėdinamos, kur yra didelis žmonių skaičius ir neįmanoma išlaikyti saugaus atstumo nuo kitų žmonių, taip pat viešajame transporte rytinio ir vakarinio piko metu.

Registracija vakcinacijai toliau vyks internetu www.koronastop.lt, taip pat kreipiantis tiesiogiai į savo šeimos gydytoją. Vakcinacija ir toliau rekomenduojama vyresniems nei 5 metų amžiaus vaikams, sustiprinančioji dozė – nuo 12 metų amžiaus.